



Date tehnice

Substanță activă: 480 g/l bentazonă
Formulare: Concentrat solubil
Număr certificat omologare: 433PC/05.06.2018
Ambalaj: 1 L, 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Basagran® SL este un erbicid pe bază de bentazonă, din grupa diazinelor. Basagran® SL are o acțiune de contact, cu impact asupra procesului de fotosinteză, fiind absorbit prin frunze și alte organe verzi. Efectul este vizibil după aproximativ 2 zile, manifestat prin îngălbirea buruienilor sensibile și apoi necrozarea lor.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Cereale, porumb, cartof, amestec cereale - leguminoase	Buruieni dicotiledonate	2,0 l/ha Se aplică în postemergență culturilor; buruieni în fază de 2-4 frunze (BBCH 12-14)
Trifoi, lucernă, amestec trifoi - graminee	Buruieni dicotiledonate	2,0 l/ha Se aplică în postemergență culturilor; buruieni în fază de 2-4 frunze (BBCH 12-14)
Bob, soia, fasole, mazăre	Buruieni dicotiledonate	2,0 l/ha Se aplică în postemergență culturilor; buruieni în fază de 2-4 frunze (BBCH 12-14)



Recomandări

Basagran® SL este un erbicid cu aplicare în postemergență culturii. Buruienile trebuie să fie răsărite și să se afle în fază de 2-4 frunze, respectiv BBCH 12-14. Este recomandat ca tratamentul să se realizeze când temperatura aerului este mai mare de 15°C și umiditatea aerului mai mare de 40%. Se va evita efectuarea tratamentului în perioadele de stres ale buruienilor.

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a erbicidelor utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării erbicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea a 200-400 l/ha soluție de erbicidat.



Avantaje

- Erbicid standard pentru combaterea buruienilor în culturile de leguminoase
- Folosire la numeroase culturi
- Formulare îmbunătățită



Cultura

